



Kemiallisen elintarviketurvallisuuden yksikkö/Rehujaosto

Kokkidiostaattien käytöstä siipikarjan rehussa

---

## Kokkidiostaattien käytöstä siipikarjan rehussa

### 1 Kokkidiostaattien käyttö rehun lisäaineena

EU:ssa hyväksytyt kokkidiostaatteja saa käyttää siipikarjan rehussa broilereiden, kananuorikoiden (16 viikon ikään asti) ja kalkkunoiden rehussa rehun lisäaineiden hyväksymisasetuksissa esitetyin edellytyksin. Kullekin kokkidiostaatille on eläinlaji- tai eläinryhmäkohtaisesti asetettu vähimmäis- ja enimmäispitoisuudet täysrehussa (12 % kosteus) sekä tarvittaessa varoaika. Jos kokkidiostaatille on asetettu jäämien enimmäispitoisuus (JEM) elintarvikkeessa, se ei saa ylittyä.

Rehun lisäaineiden hyväksymisasetukset ovat komission ylläpitämässä rehun lisäainerekisterissä

[https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register\\_en](https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en)

### 2 Kokkidiostaatteja sisältävät täydennysrehut

Ruokaviraston luvalla saa edelleen toistaiseksi valmistaa teollisia siipikarjan täydennysrehuja, jotka voivat silloin sisältää korkeintaan viisinkertaisen pitoisuuden ko. eläinlajille ja eläinryhmälle täysrehussa sallitun pitoisuuden kokkidiostaatteja. Kun kokkidiostaatteja sisältäviä rehuja käytetään eläinten ruokinnassa, niin tulee noudattaa kokkidiostaatille asetettua varoaikaa ja ilmoittaa se pakkausmerkinnöissä. Varoaika on ilmoitettava vähimmäisaikana, joka ei saa alittua, mutta voi ylittyä.

Kokkidiostaatteja sisältävän teollisen rehun käyttö tilalla viljalisäyksellä on käytännössä kokkidiostaattia sisältävän teollisen rehun käyttöä tilalla täydennysrehuna. Kokkidiostaattia sisältävän täydennysrehun ravitsemuksellinen koostumus tulee silloin olla suunniteltu siten, että se tilalla ko. rehun käyttöohjeen mukaisella viljalisäyksellä täyttää eläimen päivittäisen ravinnon ja ravintoaineiden saannin täysrehuna. Näiden teollisten täydennysrehujen tulee siten sisältää riittävän paljon muita ravintoaineita esim. valkuaisaineita, ettei niitä voida tilalla käyttää sellaisenaan täysrehujen tapaan, vaan ne on sekoitettava muuhun rehuun ennen eläinten ruokintaa.

Jos rehujen valmistajat käyttöohjeessa suosittelevat kokkidiostaattia sisältävän teollisen siipikarjan rehun lisäksi käytettävän kotoista viljaa, niin rehulta vaadittava kokkidiostaatin vähimmäis- ja enimmäispitoisuus pitää tällaisella rehuyhdistelmällä (teollinen rehu + vilja) täytyä laskennallisesti ja viljan lisäys olla ohjeistettu käyttöohjeessa sen mukaisesti. Rehun valmistajan tulee lisäksi viljalisäyksen vähimmäis- ja enimmäismäärää määrittäessään huomioida tuotantolaitoksensa rehun tuotantoprosessin normaalit vaihtelut, jotta koko



Kemiallisen elintarviketurvallisuuden yksikkö/Rehijaosto

## Kokkidiostaattien käytöstä siipikarjan rehusssa

---

viljalisätyn rehuannoksen kokkidiostaattien pitoisuus on rehusäädösten asettamissa rajoissa myös lopullisessa eläinten ruokintaan käytettävässä täysrehussa tilalla.

Lisätietoja: [rehukyselyt@ruokavirasto.fi](mailto:rehukyselyt@ruokavirasto.fi)